

001. Укажите неправильное утверждение.

Сыпь является характерным синдромом болезней:

- а) гриппа
- б) скарлатины
- в) кори
- г) брюшного тифа
- д) риккетсиоза

002. Укажите неправильное утверждение.

Гепатолиенальный синдром характерен для следующих инфекций:

- а) лептоспироз
- б) инфекционный мононуклеоз
- в) сыпной тиф
- г) возвратный эпидемический тиф
- д) грипп

003. Антитоксические сыворотки применяются для лечения:

- а) менингококковой инфекции
- б) рожи
- в) сыпного тифа
- г) ботулизма
- д) сальмонеллеза

004. Для брюшного тифа характерна сыпь:

- а) уртикарная
- б) розеолезная
- в) петехиальная
- г) везикулярная
- д) папулезная

005. Укажите неправильное утверждение.

Для холеры характерны следующие проявления:

- а) обильный водянистый стул
- б) судороги
- в) схваткообразные боли в эпигастрии
- г) гипотермия
- д) руки «прачки»

006. Острый аппендицит является характерным осложнением:

- а) брюшного тифа
- б) дизентерии
- в) неспецифического язвенного колита
- г) псевдотуберкулеза
- д) холеры

007. Укажите неправильное утверждение.

Для вирусного гепатита С характерны следующие особенности:

- а) острое циклическое течение болезни
- б) преобладание бессимптомной инфекции
- в) парентеральный путь заражения
- г) легкое течение болезни
- д) хронизация гепатита

008. Укажите неправильное утверждение.

Характерными симптомами бруцеллеза являются:

- а) высокая лихорадка
- б) ознобы
- в) потливость
- г) выраженная интоксикация
- д) полиаденопатия

009. Препаратом выбора для лечения лептоспироза является:

- а) эритромицин
- б) стрептомицин
- в) пенициллин
- г) левомицетин
- д) гентамицин

010. Заражение менингококковой инфекцией происходит:

- а) воздушно-пылевым путем
- б) через инфицированные предметы
- в) трансмиссивным путем
- г) половым путем
- д) воздушно-капельным путем

011. Укажите неправильное утверждение.

Менингококковая инфекция может протекать в следующих клинических формах:

- а) назофарингит
- б) ларинготрахеит
- в) менингит
- г) менингококцемия
- д) смешанная форма

012. Укажите неправильное утверждение.

Для лабораторной диагностики инфекционного мононуклеоза применяют следующие методы:

- а) реакция Гоффа-Бауэра
- б) реакция Пауля-Буннеля
- в) общий анализ крови
- г) бактериологический анализ крови
- д) иммуноферментный анализ

013. Для диагностики сыпного тифа используют:

- а) реакцию связывания комплемента
- б) выделение гемокультуры возбудителя
- в) реакцию Видаля
- г) реакцию Райта
- д) реакцию Хеддльсона

014. Возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом является:

- а) простейшие
- б) бактерии
- в) риккетсия
- г) вирус
- д) хламидия

015. Укажите неправильное утверждение.

Для первичной рожи характерны следующие симптомы:

- а) острое начало болезни
- б) наличие участка гиперемии кожи с нечеткими границами
- в) выраженная интоксикация
- г) лимфаденит
- д) локальная болезненность

016. Укажите неправильное утверждение.

Для сибиреязвенного карбункула характерны:

- а) отсутствие гиперемии кожи
- б) выраженный отек мягких тканей
- в) локальная болезненность
- г) наличие черного струпа в центре карбункула
- д) лимфаденит

017. Укажите неправильное утверждение.

Для инфекционного мононуклеоза характерно:

- а) лихорадка
- б) тонзиллит
- в) полиаденопатия
- г) гепато-лиенальный синдром
- д) печеночная недостаточность

018. Укажите неправильное утверждение.

Характерными проявлениями сыпного тифа являются:

- а) острое начало болезни
- б) розеолезно-петехиальная сыпь
- в) полиаденит
- г) головная боль
- д) бессонница

019. Для купирования малярийного приступа применяют:

- а) хиноцид
- б) хингамин
- в) примахин
- г) пириметамин
- д) тетрациклин

020. Наиболее характерным симптомом туляремии является:

- а) сыпь
- б) лимфаденит
- в) полиартрит
- г) ринит
- д) диарея

021. Укажите неправильное утверждение.

Для периода первичных клинических проявлений ВИЧ-инфекции характерны:

- а) лихорадка
- б) полиаденит
- в) диарея
- г) кандидоз слизистых оболочек ротоглотки
- д) гепато-лиенальный синдром

022. Укажите неправильное утверждение.

Факторами, способствующими хронизации рожи, являются:

- а) хроническая пневмония
- б) венозная недостаточность
- в) эпидермофития стоп
- г) сахарный диабет
- д) нарушение правил личной гигиены

023. Препаратом выбора для лечения риккетсиозов являются:

- а) аминогликозиды
- б) сульфаниламиды
- в) тетрациклины
- г) рифампицин
- д) нитрафурановые

024. Наличие лимфаденита характерно для:

- а) сибирской язвы
- б) клещевого энцефалита
- в) сыпного тифа
- г) орнитоза
- д) гриппа

025. Пенициллин является препаратом выбора для лечения:

- а) гриппа
- б) брюшного тифа
- в) дизентерии
- г) вирусных гепатитов
- д) лептоспироза

026. Специфическим осложнением брюшного тифа является:

- а) миокардит
- б) пиелит
- в) паротит
- г) кишечное кровотечение
- д) менингоэнцефалит

027. Для дизентерии характерен стул:

- а) каловый
- б) со слизью, пропитанной кровью
- в) скудный, бескаловый, слизисто-кровянистый
- г) обильный, водянистый, зловонный
- д) жидкий, пенный, желтого цвета

028. Укажите неправильное утверждение.

При установке диагноза ПТИ показаны:

- а) экстренная госпитализация больного
- б) назначение тетрациклина
- в) промывание желудка
- г) внутривенная инфузионная терапия
- д) назначение ферментных препаратов

029. Укажите неправильное утверждение.

Для генерализованной формы иерсиниоза наиболее характерны:

- а) высокая лихорадка
- б) гепато-лиенальный синдром
- в) полиаденит
- г) везикулезная сыпь
- д) диспептические симптомы

030. Укажите неправильное утверждение.

Для вирусного гепатита D характерно:

- а) сочетание с вирусным гепатитом В
- б) гепатолиенальный синдром
- в) выраженная лихорадочная реакция
- г) развитие острой печеночной недостаточности
- д) доброкачественное течение

031. Укажите неправильное утверждение.

Для диагностики бруцеллеза используются следующие лабораторные тесты:

- а) реакцию Райта
- б) реакцию Хеддельсона
- в) реакцию Видаля
- г) реакцию Кумбса
- д) пробу Бюрне

032. Укажите неправильное утверждение.

Для гриппа характерны:

- а) насморк
- б) инъекция конъюнктив
- в) лихорадка
- г) боль в глазных яблоках
- д) диспептический синдром

033. Укажите неправильное утверждение. Лихорадка является характерным симптомом следующих инфекционных болезней:

- а) брюшной тиф
- б) холера
- в) сальмонеллез
- г) лептоспироз
- д) бруцеллез

034. Левомецетин применяется для лечения:

- а) пищевых токсикоинфекций
- б) амебиаза
- в) гриппа
- г) трихоцефалеза
- д) брюшного тифа

035. Полиаденит свойственен следующей инфекционной болезни:

- а) сепсису
- б) столбняку
- в) бешенству
- г) ВИЧ-инфекции
- д) роже

036. При брюшном тифе наибольшее значение имеет выделение возбудителя в окружающую среду:

- а) со слюной и мочой
- б) со слюной и фекалиями
- в) с фекалиями и мокротой
- г) с фекалиями и мочой
- д) со рвотными массами и слюной

037. Наиболее информативным методом диагностики дизентерии является:

- а) бактериологическое исследование кала
- б) ректороманоскопия
- в) бактериологическое исследование крови
- г) реакция пассивной гемагглютинации
- д) кожная аллергическая проба

038. Укажите неправильное утверждение.

Для гастроинтестинальной формы сальмонеллеза характерны:

- а) интоксикация
- б) лихорадка в течение 7-10 дней
- в) острый гастроэнтерит
- г) обезвоживание
- д) нарушения процессов переваривания и всасывания

039. Укажите неправильное утверждение.

Для вирусного гепатита А характерно:

- а) острое начало
- б) гриппоподобный синдром в преджелтушном периоде
- в) улучшение состояния при переходе в желтушный период
- г) повышение показателя тимоловой пробы
- д) хронизация гепатита

040. Укажите неправильное утверждение.

Для вирусного гепатита Е характерны:

- а) водный путь заражения
- б) парентеральный путь заражения
- в) боли в правом подреберье
- г) среднетяжелое течение болезни
- д) полное выздоровление

041. Укажите неправильное утверждение.

Для лечения бруцеллеза используют следующие антибиотики:

- а) стрептомицин
- б) левомецетин
- в) тетрациклин
- г) рифампицин
- д) пенициллин

042. Укажите неправильное утверждение.

Для гриппа характерны:

- а) сыпь
- б) ломота в мышцах
- в) головная боль
- г) лихорадка
- д) гиперемия лица

043. Заражение сыпным тифом происходит:

- а) контактным путем
- б) воздушно-пылевым путем
- в) при укусах кровососущих насекомых
- г) при втирании в кожу испражнений зараженных вшей
- д) при раздавливании вшей на коже

044. Укажите неправильное утверждение.

Полиаденин свойственен следующим инфекционным болезням:

- а) инфекционный мононуклеоз
- б) ВИЧ-инфекция
- в) менингококковая инфекция
- г) бруцеллез
- д) аденовирусная инфекция

045. Тетрациклины применяются при лечении:

- а) столбняка
- б) брюшного тифа
- в) геморрагических лихорадок
- г) сыпного тифа
- д) вирусных гепатитов

046. Продолжительность инкубационного периода при брюшном тифе составляет:

- а) 1-3 дня
- б) 7-14 дней
- в) 14-28 дней
- г) 28 дней и более
- д) 7-25 дней

047. Регидратационную терапию при холере с обезвоживанием 3-й ст. следует проводить:

- а) гемодезом
- б) полиионными растворами со скоростью 120 кап/мин
- в) 10% раствором глюкозы
- г) реополиглюкином
- д) полиионными растворами со скоростью 100 мл/мин

048. Укажите неправильное утверждение.

Для вирусного гепатита В характерны:

- а) диспептические расстройства в преджелтушном периоде
- б) ухудшение состояния при переходе в желтушный период
- в) улучшение состояния больного с появлением желтухи
- г) выраженный холестатический синдром
- д) обнаружение в крови анти-Hbs

049. Укажите неправильное утверждение.

Характерным симптомом ботулизма является:

- а) двоение в глазах
- б) поперхивание пищей
- в) лихорадка
- г) чувство нехватки воздуха
- д) диспепсические симптомы

050. Укажите неправильное утверждение.

Источником инфекции при бруцеллезе могут быть:

- а) овцы
- б) козы
- в) больной человек
- г) коровы
- д) свиньи

051. Укажите неправильное утверждение.

Для успешного лечения гриппа необходимо как можно раньше назначать:

- а) ремантадин
- б) бисептол
- в) тепловые процедуры
- г) противогриппозный иммуноглобулин
- д) обильное питье

052. Возбудителем сыпного тифа является:

- а) спирохета
- б) сальмонелла тифимуриум
- в) микоплазма
- г) риккетсия
- д) хламидия

053. Укажите неправильное утверждение. Менингококковая инфекция характеризуется:

- а) острым началом болезни
- б) гипертермией
- в) ознобом
- г) геморрагической сыпью
- д) гепатоспленомегалией

054. Укажите неправильное утверждение.

Для орнитоза характерны:

- а) контакт с больной собакой
- б) контакт с больной птицей
- в) лихорадка
- г) пневмония
- д) катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей

055. Заражение малярией происходит в результате укуса;

- а) комара рода куликс
- б) комара рода анофелес
- в) иксодового клеща
- г) блохи
- д) платяной вши

056. Укажите неправильное утверждение. Характерными симптомами геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются:

- а) гиперемия и одутловатость лица
- б) высокая лихорадка
- в) желтуха
- г) геморрагический синдром
- д) протеинурия

057. Укажите неправильное утверждение.

Для СПИДа характерны:

- а) кандидозный эзофагит
- б) генерализованная саркома Капоши
- в) кахексия
- г) остеоартроз
- д) хроническая пневмония

058. Укажите неправильное утверждение.

Для тропической малярии характерны следующие симптомы:

- а) озноб
- б) лихорадка неправильного типа
- в) гепатолиенальный синдром
- г) анемия
- д) розеолезно-макулезная сыпь

059. Укажите неправильное утверждение.

Острая фаза гельминтозов характеризуется:

- а) симптомами, обусловленными локализацией паразита в организме
- б) лихорадкой
- в) зудящими высыпаниями на коже
- г) токсико-аллергическим поражением сердца и печени
- д) гиперэозинофилией крови

060. Укажите неправильное утверждение:

- а) возбудителем ВИЧ-инфекции является вирус
- б) основной путь передачи ВИЧ-инфекции половой
- в) заражение ВИЧ может происходить при длительном бытовом контакте
- г) клиническая картина СПИДа не отличается от клинической картины других приобретенных иммунодефицитов
- д) одна из причин летальных исходов при ВИЧ-инфекции - злокачественные новообразования

061. Укажите неправильное утверждение.

Для лептоспироза характерны:

- а) озноб
- б) полиаденит
- в) высокая лихорадка
- г) гепатолиенальный синдром
- д) головная боль

062. Укажите неправильное утверждение.

Характерными симптомами сепсиса являются:

- а) диарея
- б) лихорадка
- в) озноб
- г) гепатолиенальный синдром
- д) сыпь

063. Укажите неправильное утверждение.

Лихорадка является характерным симптомом следующих инфекционных болезней:

- а) туляремия
- б) дифтерия
- в) ботулизм
- г) сыпной тиф
- д) Ку-лихорадка

064. Специфический иммуноглобулин применяется при лечении:

- а) бруцеллеза
- б) псевдотуберкулеза
- в) амебиоза
- г) эхинококкоза
- д) бешенства

065. Антитоксические сыворотки применяются для лечения:

- а) эхинококкоза
- б) инфекционного мононуклеоза
- в) лептоспироза
- г) дифтерии
- д) псевдотуберкулеза

066. Ведущим в патогенезе брюшного тифа является поражение:

- а) печени и селезенки
- б) легких
- в) лимфатического аппарата тонкой кишки
- г) ЦНС
- д) лимфатического аппарата толстой кишки

067. Лихорадка постоянного типа характерна:

- а) для бруцеллеза
- б) для иерсиниоза
- в) для туляремии
- г) для брюшного тифа
- д) для сибирской язвы

068. Гепатолиенальный синдром является типичным проявлением:

- а) брюшного тифа
- б) сибирской язвы
- в) паротита
- г) дизентерии
- д) холеры

069. Пенициллин является препаратом выбора при лечении:

- а) холеры
- б) рожи
- в) трихинеллеза
- г) бруцеллеза
- д) инфекционного мононуклеоза

070. Эритромицин является препаратом выбора для лечения:

- а) орнитоза
- б) брюшного тифа
- в) легионеллеза
- г) дифтерии
- д) иерсиниоза

071. Антитоксические сыворотки применяются для лечения:

- а) сальмонеллеза
- б) столбняка
- в) вирусных гепатитов
- г) холеры
- д) энтеробиоза

072. Изнуряющий тип лихорадки характерен:

- а) для сепсиса
- б) для геморрагических лихорадок
- в) для лептоспироза
- г) для инфекционного мононуклеоза
- д) для столбняка

073. Сыпь является характерным клиническим симптомом:

- а) дифтерии
- б) столбняка
- в) малярии
- г) скарлатины
- д) ботулизма

074. Наличие лимфаденита характерно:

- а) для менингококковой инфекции
- б) для вирусного гепатита С
- в) для столбняка
- г) для гриппа
- д) для рожи

075. Полиаденит свойственен следующим инфекционным болезням:

- а) бруцеллез
- б) грипп
- в) ботулизм
- г) дифтерия
- д) геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

076. Специфическая пневмония характерна для:

- а) сыпного тифа
- б) малярии
- в) орнитоза
- г) сальмонеллеза
- д) бруцеллеза

077. Лихорадка длительностью более 5 дней характерна для:

- а) дизентерии
- б) брюшного тифа
- в) краснухи
- г) вирусного гепатита
- д) гриппа

078. Сыпь является характерным клиническим проявлением:

- а) амебиаза
- б) бруцеллеза
- в) кори
- г) дизентерии
- д) легионеллеза

079. Наличие лимфаденита характерно для:

- а) вирусного гепатита С
- б) амебиаза
- в) холеры
- г) туляремии
- д) сальмонеллеза

080. Укажите неправильное утверждение.

Гепатолиенальный синдром характерен для следующих инфекционных болезней:

- а) лептоспироз
- б) инфекционный мононуклеоз
- в) сыпной тиф
- г) возвратный эпидемический тиф
- д) грипп

081. Укажите неправильное утверждение в отношении сепсиса:

- а) вызывается условно-патогенной флорой
- б) характерно наличие входных ворот инфекции
- в) характерен полиморфизм клинической симптоматики
- г) течение болезни циклическое
- д) для диагностики применяется бактериологическое исследование крови

082. Укажите неправильное утверждение.

Лихорадка характерна для:

- а) холеры
- б) дифтерии
- в) туляремии
- г) сыпного тифа
- д) Ку-лихорадки

083. При брюшном тифе:

- а) продолжительность лихорадки не превышает 7 дней
- б) часто наблюдается стул со слизью и кровью
- в) наиболее ярким симптомом является длительная лихорадка
- г) при ректороманоскопии обнаруживаются язвы
- д) наблюдаются выраженные ознобы и поты

084. При дифтерии:

- а) главным звеном патогенеза является бактериемия
- б) характерным является наличие гепатолиенального синдрома
- в) в основе патогенеза лежит действие токсина
- г) характерно наличие обширных гнойных налетов на слизистой ротоглотки
- д) часто наблюдается полиаденопатия

085. При дифтерии ротоглотки:

- а) подчелюстные лимфоузлы резко болезненны и спаяны с окружающими тканями
- б) характерно наличие фибриновых налетов на миндалинах, переходящих на дужки и небо
- в) при объективном осмотре ротоглотки "пылающий зев"
- г) наблюдается болезненность и затруднение открывания рта
- д) болезнь начинается с ярко выраженных катаральных явлений

086. Укажите неправильное утверждение.

При токсической дифтерии:

- а) характерным осложнением является токсический гепатит
- б) основная причина смерти поражение миокарда
- в) токсическая полинейропатия может развиваться через 6-8 недель от начала болезни
- г) наблюдается отек шейной клетчатки, распространяющийся на грудную клетку
- д) возможно развитие тромбгеморрагического синдрома

087. Укажите неправильное утверждение. При дифтерии:

- а) возможно развитие асфиксии
- б) характерна язвенно-некротическая ангина
- в) часто поражаются дыхательные пути
- г) дифференциальный диагноз проводят со скарлатиной
- д) частым осложнением является миокардит

088. При дифтерии:

- а) лечение следует начинать с антибиотикотерапии
- б) противодифтерийную сыворотку следует вводить до полного отторжения налетов
- в) применение сердечных гликозидов показано при развитии миокардита
- г) основным методом лечения бактериовыделителей является введение противодифтерийной сыворотки
- д) основу лечения составляет введение противодифтерийной сыворотки

089. Укажите неправильное утверждение. Гепатит с синдромом желтухи наблюдается при следующих инфекционных болезнях:

- а) сыпной тиф
- б) иерсиниоз
- в) лептоспироз
- г) инфекционный мононуклеоз
- д) цитомегаловирусная инфекция

090. Укажите неправильное утверждение. Диарея является характерным симптомом:

- а) дизентерии
- б) сальмонеллеза
- в) ботулизма
- г) амебиоза
- д) холеры

091. Укажите неправильное утверждение.

Миокардит является частым осложнением следующих болезней:

- а) дифтерии
- б) энтеровирусной инфекции
- в) скарлатины
- г) иерсиниоза
- д) вирусных гепатитов

092. К кишечным гельминтозам относится:

- а) фасциолез
- б) аскаридоз
- в) описторхоз
- г) эхинококкоз
- д) лямблиоз

093. Укажите неправильное утверждение. При острых респираторных заболеваниях:

- а) в отличие от гриппа, отсутствует интоксикационный синдром
- б) поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и ротоглотки
- в) возможно развитие крупа
- г) осложнения чаще всего вызываются бактериальной флорой
- д) в ранние сроки болезни следует назначать антибиотики

094. Укажите неправильное утверждение. При гриппе:

- а) наиболее ранним симптомом является першение в горле
- б) наблюдается токсическое поражение ЦНС
- в) лихорадка обычно не превышает 3-5 дней
- г) никогда не наблюдается сыпи
- д) болезнь начинается с симптомов общей интоксикации

095. Укажите неправильное утверждение:

- а) геморрагическая лихорадка встречается в Московской области
- б) при геморрагических лихорадках часто поражаются почки
- в) геморрагические лихорадки являются болезнями стран с тропическим и субтропическим климатом
- г) при геморрагических лихорадках геморрагические проявления развиваются на фоне лихорадки и интоксикации
- д) геморрагические лихорадки вызываются исключительно вирусами

096. Укажите неправильное утверждение.

Для сыпного тифа характерны следующие симптомы:

- а) острое начало болезни
- б) менингеальный синдром
- в) увеличение селезенки
- г) "кроличьи" глаза
- д) обильная пятнисто-папулезная сыпь

097. Укажите неправильное утверждение. При столбняке:

- а) самым ранним симптомом является тризм
- б) после перенесенной болезни развивается стойкий иммунитет
- в) развитие болезни обусловлено действием столбнячного токсина
- г) гипертермия является прогностически неблагоприятным симптомом
- д) лечение следует проводить в условиях реанимационного отделения

098. Укажите неправильное утверждение. При бешенстве:

- а) заражение возможно при попадании слюны больного животного на кожу
- б) наиболее ярким симптомом болезни является гидрофобия
- в) вакцинация является наиболее надежным средством профилактики
- г) возможно полное излечение при своевременно начатом лечении
- д) вакцинации подлежат все укушенные подозрительными на бешенство животными

099. Укажите неправильное утверждение. При чуме:

- а) заражение происходит только трансмиссивным путем
- б) характерна резко выраженная общая интоксикация
- в) самый частый симптом лимфоаденит (бубон)
- г) наибольшую эпидемическую опасность представляет легочная форма болезни
- д) раннее применение антибиотиков резко снижает летальность

100. Укажите неправильное утверждение.

Наиболее опасными осложнениями инфекционных болезней являются следующие:

- а) инфекционно-токсический шок
- б) гиповолемический шок
- в) отек мозга
- г) анафилактический шок
- д) хирургические осложнения

101. Укажите симптомы, не характерные для холеры:

- а) рвота
- б) боль в желудке
- в) стул обильный светлый без запаха
- г) нормальная температура
- д) диарея предшествует рвоте

102. Генерализованную форму иерсинноза отличают от локализованной:

- а) рвота
- б) увеличение печени и селезенки
- в) боли в правой подвздошной области

103. Не характерный вариант продромального периода вирусного гепатита А:

- а) гриппоподобный
- б) астеновегетативный
- в) диспептический
- г) артралгический

104. Что не относится к осложнениям брюшного тифа:

- а) кишечное кровотечение
- б) перитонит
- в) токсико-инфекционный шок
- г) язвенный процесс в кишечнике

105. При вирусных гепатитах какие биохимические тесты отражают цитолиз:

- а) АЛТ и АСТ
- б) ГГТ
- в) щелочная фосфатаза
- г) тимоловая проба
- д) сулемовая проба

105. При вирусных гепатитах какие биохимические тесты отражают мезенхимальную реакцию:

- а) АЛТ и АСТ
- б) ГГТ
- в) щелочная фосфатаза
- г) тимоловая проба
- д) сулемовая проба

105. При вирусных гепатитах какие биохимические тесты отражают холестаз:

- а) АЛТ и АСТ
- б) СДГ
- в) щелочная фосфатаза
- г) тимоловая проба
- д) сулемовая проба

106. Тяжесть течения болезни при холере обуславливает:

- а) интоксикация
- б) изотоническая дегидратация
- в) инвазия возбудителя в слизистую кишечника

107. Для острого периода амебиаза кишечника характерно:

- а) рвота
- б) боли в эпигастрии
- в) жидкий стул типа «малинового желе»
- г) скудный жидкий типа «ректального плевка»

108. Иммунологическими маркерами острой формы вирусного гепатита В не является:

- а) HBsAg
- б) HBeAg
- в) анти-HBc<sub>or</sub> Ig M
- г) анти-HBc<sub>or</sub> Ig G

109. Укажите неправильное утверждение. Наиболее информативными симптомами лептоспироза являются:

- а) интоксикация
- б) увеличение лимфоузлов
- в) интенсивная миалгия
- г) геморрагии на коже
- д) поражение почек

110. Перфорация кишечника при брюшном тифе соответствует:

- а) период мозговидного набухания пейеровых бляшек и солитарных фолликулов
- б) период некроза
- в) период образования язв
- г) период чистых язв
- д) период заживления ран

111. Не характерный тип температурной кривой при типичном течении брюшного тифа:

- а) трапецевидная Вунделаха
- б) септическая
- в) субфебрильная
- г) интермитирующая
- д) возвратная

112. Укажите неправильное утверждение. Клинические признаки декомпенсированного обезвоживания:

- а) гипотермия
- б) генерализованные судороги
- в) повышение АД
- г) нитевидный пульс
- д) анурия

113. Укажите неправильное утверждение. Синдромами, характерными для иерсиниоза являются:

- а) гастроинтестинальный
- б) аллергический
- в) неврологический
- г) артралгический

114. Укажите неправильное утверждение. Основные синдромы ботулизма:

- а) миастенический
- б) менингеальный
- в) гастроинтестинальный
- г) псевдопаралитический

115. Укажите неправильное утверждение.

Клиническими симптомами острой печеночной недостаточности являются:

- а) увеличение печени
- б) тахикардия
- в) сокращение размеров печени
- г) энцефалопатия
- д) геморрагии

116. Антибактериальные препараты для лечения генерализованной формы сальмонеллеза:

- а) фуразалидон
- б) эритромицин
- в) пенициллин
- г) левомицетин

117. Процент потери массы тела при обезвоживании 4-ой степени алгидной форме холеры:

- а) до 3
- б) 4-6
- в) 7-9
- г) 10 и более
- д) 20

118. Укажите неправильное утверждение. Характерные изменения периферической крови при брюшном тифе:

- а) лейкопения
- б) лейкоцитоз
- в) относительный лимфоцитоз
- г) анэозинофилия
- д) умеренное увеличение СОЭ

119. Для энтеробиоза наиболее характерен симптом:

- а) зуд и жжение в области ануса
- б) раздражительность
- в) лихорадка
- г) боли в животе
- д) увеличение печени и селезенки

120. Укажите неправильное утверждение. Для начального периода лептоспироза характерны

- а) высокая температура
- б) миалгия
- в) схваткообразные боли в животе
- г) гиперемия лица
- д) конъюнктивит, склерит

121. Информативный биохимический тест в продромальном периоде вирусного гепатита А:

- а) Общий билирубин
- б) белковые фракции крови
- в) ферменты АЛТ, АСТ
- г) щелочная фосфатаза
- д) холестерин

122. Возбудителя холеры можно обнаружить:

- а) в крови
- б) в моче
- в) в кале
- г) в спинномозговой жидкости

123. Укажите неправильное утверждение. Для брюшного тифа характерны:

- а) бледность кожных покровов
- б) розеолезная экзантема
- в) гепатоспленомегалия
- г) тахикардия
- д) относительная брадикардия

124. Укажите неправильное утверждение.

При декомпенсированном обезвоживании при холере наблюдается:

- а) увеличение ОЦК
- б) декомпенсированный метаболический ацидоз
- в) гипокалиемия
- г) гипоксия
- д) увеличение гематокрита

125. Укажите неправильное утверждение. Клинические симптомы ботулизма:
- а) двоение, "сетка", "туман" перед глазами
  - б) затруднение глотания пищи, "комоч" за грудиной
  - в) нарушение дыхания
  - г) сухость во рту
  - д) частый, скудный стул
126. Укажите неправильное утверждение. Кардиальными симптомами трихинеллеза являются:
- а) кашель
  - б) лихорадка
  - в) отеки век и лица
  - г) миалгия
  - д) эозинофилия
127. Укажите основной патогенетический механизм, обуславливающий диарею при холере:
- а) воспаление слизистой оболочки кишечника
  - б) проникновение вибриона в энтероциты
  - в) активация аденилатциклазы энтероцитов холерогеном
  - г) нарушение всасывания жидкости
  - д) ускоренный пассаж кишечного содержимого
128. Первичной локализацией патологического процесса в кишечнике при амебиазе является:
- а) слепая и восходящая кишка
  - б) поперечно-ободочная
  - в) прямая
  - г) сигмовидная
  - д) подвздошная и тощая
129. Для гастроэнтероколитической формы дизентерии не характерны:
- а) тошнота, рвота
  - б) схваткообразные боли в левой подвздошной области
  - в) схваткообразные боли в животе, диффузные
  - г) жидкий стул, обильный, типа «болотной тины»
  - д) жидкий стул, сначала обильный, затем скудный с примесью слизи и прожилок крови
130. При брюшном тифе характерны в следующие сроки появление сыпи;
- а) 1 -3-й день болезни
  - б) 4-7-й день болезни
  - в) 8-10-й день болезни
  - г) после 14-го дня болезни
  - д) в любые сроки
131. Для вирусного гепатита типично:
- а) повышение общего билирубина только за счет связанной фракции
  - б) повышение билирубина только за счет свободной фракции
  - в) повышение преимущественно за счет связанной фракции
132. Укажите неправильное утверждение. При лечении иерсиниоза используются:
- а) пенициллин
  - б) тетрациклин
  - в) гентамицин
  - г) левомицетин
  - д) пefлoксицин
133. Причиной цитолиза гепатоцитов при вирусном гепатите В является:
- а) непосредственное действие вируса на гепатоциты
  - б) иммунный ответ на вирусные антигены и клеточные аутоантигены
  - в) внутрипеченочный холестаз
134. Укажите клинические варианты дизентерии, при которых наиболее выражено обезвоживание:
- а) колитическая

- б) гастроэнтероколитическая
- в) энтероколитическая

135. Укажите неправильное утверждение.

В практике используются для обнаружения возбудителя брюшного тифа в диагностических целях:

- а) кровь
- б) рвотные массы
- в) моча
- г) кал
- д) желчь

136. Укажите, какой наиболее характерный стул при колитической форме дизентерии:

- а) обильный, водянистый без примесей
- б) скудный жидкий стул с примесями слизи и крови
- в) жидкий с обильной слизью и кровью стул

137. Укажите неправильное утверждение. Наиболее частые симптомы, характеризующие псевдотуберкулез:

- а) обильная мелкоточечная сыпь
- б) гиперемия кожи лица, шеи, ладоней
- в) лихорадка
- г) "малиновый" язык
- д) пневмония

138. Укажите неправильное утверждение. Симптомы, характерные для кишечного кровотечения при брюшном тифе:

- а) боли в животе
- б) тахикардия
- в) падение АД
- г) снижение гемоглобина
- д) мелена

139. Для подтверждения диагноза генерализованной формы сальмонеллеза исследуется:

- а) рвотные массы
- б) кал
- в) кровь
- г) моча

140. Укажите неправильное утверждение. Для пищевой токсикоинфекции характерны:

- а) повышение температуры
- б) рвота
- в) боли в эпигастральной области
- г) боли в нижней части живота
- д) частый водянистый стул

141. Укажите неправильное утверждение. Для 1-й недели брюшного тифа характерны:

- а) лихорадка
- б) бледность кожных покровов
- в) упорная головная боль
- г) относительная брадикардия
- д) розеолезная сыпь

142. Для пероральной регидратации при пищевой токсикоинфекции со 2 степенью обезвоживания применяют:

- а) физиологический раствор
- б) регидрон
- в) квартосоль
- г) дисоль
- д) хлосоль

143. Укажите неправильное утверждение. При лечении брюшного тифа используют:

- а) пенициллин
- б) левомицетин

- в) ампициллин
- г) фторхинолоны

144. Укажите неправильное утверждение. Клинические симптомы, характерные для гриппа:

- а) лихорадка до 5 дней
- б) длительная лихорадка
- в) выраженный интоксикационный синдром
- г) гиперемия лица
- д) сухой кашель, першение в горле

145. Укажите неправильное утверждение.

Для инфекционного мононуклеоза в периферической крови характерны:

- а) лейкоцитоз
- б) нейтропения
- в) лимфоцитоз с моноцитозом
- г) лимфопения
- д) атипичные мононуклеары

146. Средством этиотропного лечения гриппа является:

- а) пенициллин
- б) бисептол
- в) ремантадин
- г) фторхинолоны

147. Укажите неправильное утверждение. Для аденовирусных заболеваний характерны:

- а) лимфоаденопатия
- б) гиперемия и отечность миндалин, задней стенки глотки
- в) сыпь на коже
- г) односторонний конъюнктивит
- д) фарингит

148. Укажите неправильное утверждение. Характерными симптомами орнитоза являются:

- а) высокая температура
- б) пневмония
- в) гепатоспленомегалия
- г) поражение почек
- д) лейкопения

149. Достоверным критерием менингококкового менингита являются изменения в ликворе:

- а) нейтрофильный плеоцитоз
- б) снижение глюкозы
- в) повышение белка
- г) обнаружение возбудителя

150. Препаратом выбора для лечения орнитоза является:

- а) пенициллин
- б) тетрациклин
- в) бисептол
- г) эритромицин
- д) нитрофураны

151. Характерная сыпь при менингококцемии:

- а) симметрично расположенная в области суставов пятнисто-папулезная сыпь
- б) звездчатой формы геморрагическая сыпь с некрозом в центре
- в) розеолезно-папулезная на коже живота
- г) мелкоточечная
- д) розеолезно-петехиальная

152. Укажите неправильное утверждение. Характерными симптомами инфекционного мононуклеоза являются:

- а) лихорадка
- б) гиперплазия лимфоузлов и поражение миндалин
- в) увеличение печени и селезенки

- г) лейкоцитоз с выраженным лимфо-моноцитозом
- д) нейтрофилезный лейкоцитоз

153. Укажите оптимальную суточную дозу пенициллина для лечения больного менингококковым менингитом, средней тяжести, вес 80 кг?

- а) 2 млн
- б) 6-12 млн
- в) 12-15 млн
- г) 18-24 млн
- д) 30-48 млн

154. Укажите характер воспаления мозговых оболочек при менингококковом менингите:

- а) серозное
- б) гнойное
- в) фибринозное

155. Укажите неправильное утверждение. Клинические признаки парагриппа:

- а) незначительная интоксикация
- б) поражение верхних дыхательных путей
- в) отек гортани с явлениями "ложного крупа"
- г) хриплый голос, "лающий кашель"
- д) абдоминальный синдром

156. Укажите, какому заболеванию соответствует приведенный анализ ликвора: мутный, беловато-желтого цвета. Цитоз - 4500 в мкл, нейтрофилы - 89%. белок - 2.2 г/л, сахар умеренно снижен.

- а) Энцефалит
- б) Туберкулезный менингит
- в) Субарахноидальное кровоизлияние
- г) Менингококковый менингит

157. Укажите неправильное утверждение. Для менингококцемии характерны:

- а) высокая температура
- б) бледность кожных покровов
- в) гиперемия лица
- г) геморрагическая сыпь на коже
- д) выраженная интоксикация

158. Для лечения молниеносной менингококкемии препаратом выбора является:

- а) пенициллин
- б) левомицетин
- в) ампициллин
- г) тетрациклин
- д) сумамед

159. Для менингококкового менингита характерны:

- а) сильная головная боль
- б) ригидность затылочных мышц и симптом Кернига
- в) полиаденит
- г) рвота
- д) высокая температура

160. Укажите неправильное утверждение. Клиническими формами аденовирусных болезней являются:

- а) рино-фарингит
- б) фарингоконъюнктивальная лихорадка
- в) конъюнктивит, кератоконъюнктивит
- г) атипичная пневмония
- д) менингоэнцефалит

161. Укажите неправильное утверждение. Для гриппа характерны:

- а) лимфоцитоз
- б) лейкопения
- в) нейтропения
- г) нейтрофилез
- д) нормальная СОЭ

162. При менингококковом менингите в крови наблюдается:

- а) лейкоцитоз
- б) нейтрофиллез
- в) сдвиг влево
- г) повышенное СОЭ
- д) лимфоцитоз

163. Больному со среднетяжелым течением парагриппа рекомендуется:

- а) обязательная госпитализация
- б) гормонотерапия
- в) ремантадин
- г) антибиотикотерапия
- д) десенсибилизирующие средства, поливитамины

164. Укажите неправильное утверждение. Наиболее типичные симптомы начального периода ГЛПС:

- а) инъекции сосудов склер и конъюнктив
- б) гиперемия и одутловатость лица
- в) бледность кожных покровов
- г) высокая лихорадка
- д) нарушение зрения

165. Укажите неправильное утверждение. Показания для обследования на малярию:

- а) все лихорадящие больные с неясным диагнозом
- б) лихорадящие больные с лимфоаденопатией
- в) доноры
- г) лихорадящие больные, прибывшие из стран, неблагоприятных в эпидемиологическом отношении по малярии
- д) лихорадящие больные, в анамнезе у которых имеются указания на перенесенную в прошлом малярию

166. Укажите неправильное утверждение. Осложнениями тропической малярии являются:

- а) кома
- б) дегидратационный шок
- в) гемоглобинурийная лихорадка
- г) инфекционно-токсический шок
- д) почечная недостаточность

167. Укажите неправильное утверждение. При лечении туляремии применяют:

- а) стрептомицин
- б) тетрациклин
- в) левомицетин
- г) пенициллин

168. Укажите неправильное утверждение. Для системного клещевого боррелиоза характерны:

- а) лихорадка
- б) артралгия, артриты, миалгия
- в) кольцевидная эритема
- г) розеолезная сыпь
- д) серозный менингит, менингоградикулоневрит

169. Длительность эритроцитарной шизогонии при трехдневной малярии:

- а) 48 часов
- б) 72 часа
- в) 24 часа
- г) 12 часов

170. Укажите неправильное утверждение. Клинические признаки сыпного тифа:

- а) острое начало
- б) розеолезно-петехиальная сыпь с 4-5-го дня болезни
- в) увеличение печени и селезенки
- г) боли в животе
- д) симптом Говорова-Годелье, тремор языка

171. Кома развивается при малярии, вызванной:

- а) *Pl.vivax*
- б) *Pl.ovale*
- в) *Pl.malaria*
- г) *Pl.falciparum*

172. Укажите неправильное утверждение. Для бубонной формы чумы характерны:

- а) выраженная интоксикация
- б) безболезненный бубон
- в) нагноение бубона
- г) локализация бубона в паховой или аксилярной области
- д) появление вторичных бубонов

173. Укажите неправильное утверждение. Поздние рецидивы наблюдаются при следующих видах малярии:

- а) трехдневная
- б) четырехдневная
- в) тропическая
- г) овале-малярии

174. Укажите неправильное утверждение. Для бубона при туляремии характерно:

- а) умеренная болезненность
- б) выраженный периаденит
- в) отчетливая конфигурация бубона
- г) отсутствие изменений кожи над бубоном
- д) склерозирование бубона

175. Для лабораторного подтверждения малярии исследуются:

- а) микроскопия крови
- б) посев крови
- в) посев мочи

176. Этиотропные средства лечения сыпного тифа:

- а) пенициллин
- б) стрептомицин
- в) клафоран
- г) тетрациклин
- д) оксациллин

177. Для ГЛПС не характерно:

- а) вирусемия
- б) повреждение слизистых оболочек дыхательных путей
- в) поражение стенки кровеносных сосудов с повышением их проницаемости
- г) поражение почек
- д) поражение надпочечников

178. Болезнь Брилла является:

- а) первичным эпидемическим сыпным тифом
- б) повторным эпидемическим сыпным тифом
- в) рецидивом эпидемического сыпного тифа
- г) болезнью, не связанной с сыпным тифом

179. Укажите характер температурной кривой при четырехдневной малярии:

- а) повышение температуры через 24 часа
- б) повышение температуры через 48 часов
- в) повышение температуры через 72 часа

180. Тропическую малярию вызывает:

- а) *Pl.vivax*
- б) *Pl.ovale*
- в) *Pl.malaria*
- г) *Pl. falciparum*

181. Укажите препараты противорецидивного действия при малярии:

- а) примахин
- б) делагил
- в) антибиотики
- г) нитрофураны

182. Для малярии характерна температурная кривая:

- а) перемежающаяся
- б) послабляющая
- в) постоянная
- г) гектическая

183. Укажите неправильное утверждение. Для бубона при чуме характерны:

- а) безболезненность
- б) резкая болезненность
- в) спаянность с окружающей клетчаткой
- г) гиперемия кожи над бубоном

184. Укажите неправильное утверждение. Для столбняка характерны:

- а) обильная потливость
- б) тризм
- в) гидрофобия
- г) тонические судороги
- д) ясное сознание

185. Исключите неправильное утверждение. Для лечения сибирской язвы применяют:

- а) пенициллин
- б) тетрациклин
- в) левомецетин-сукцинат
- г) иммуноглобулин специфический
- д) цефалоспорины

186. Укажите этиологию хронической пневмонии, наиболее характерную для ВИЧ-инфекции:

- а) стафилококковая
- б) пневмоцистная
- в) пневмококковая
- г) вирусная
- д) вирусно-бактериальная

187. Исключите неправильное утверждение. Клинические признаки, при которых показано обследование на ВИЧ:

- а) длительные диареи
- б) длительно текущие пневмонии
- в) необъяснимая потеря массы тела
- г) саркома Капоши
- д) рецидивирующий эндокардит

188. Исключите неправильное утверждение. Наиболее характерные симптомы бешенства в стадии разгара:

- а) гидрофобия, аэрофобия
- б) дыхание в виде судорожных вздохов
- в) паралич дыхания
- г) раздражительность
- д) сухость во рту

189. Укажите неправильное утверждение. Для эритематозной формы рожи характерны:

- а) высокая температура
- б) головная боль
- в) гиперемия, отечность с четкими границами в месте воспалительного очага
- г) геморрагии в месте воспалительного очага
- д) увеличение лимфатических узлов

190. Укажите неправильное утверждение. Изменения в крови при ВИЧ-инфекции:

- а) лейкоцитоз
- б) лейкопения
- в) лимфопения
- г) тромбоцитопения
- д) инверсия СД4, СД8

191. Наиболее частая локализация воспалительного очага при первичной розе:

- а) лицо
- б) нижние конечности
- в) туловище
- г) верхние конечности

192. Укажите неправильное утверждение. Для диагностики ВИЧ-инфекции применяют:

- а) иммуноферментный анализ
- б) иммуноблотинг
- в) РПГА

193. Укажите неправильное утверждение. Наиболее характерные симптомы бешенства:

- а) лимфоаденопатия
- б) гидрофобия
- в) аэрофобии
- г) параличи
- д) саливация

194. Укажите к каким субпопуляциям Т-лимфоцитов тропен возбудитель ВИЧ-инфекции:

- а) Т-хелперы
- б) Т-супрессоры
- в) Т-киллеры

195. Укажите неправильное утверждение. Стадия вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции характеризуется:

- а) прогрессирующая потеря массы тела
- б) длительный диарейным синдром
- в) стойко бактериальные, вирусные и протозойные поражения внутренних органов
- г) менингококковая инфекция
- д) саркома Капоши

001-а	051-б	101-б	151-б
002-д	052-г	102-б	152-д
003-г	053-д	103-г	153-г
004-б	054-а	104-д	154-б
005-в	055-б	105-в	155-д
006-г	056-в	106-б	156-г
007-а	057-г	107-в	157-в
008-г	058-д	108-г	158-б
009-в	059-а	109-б	159-в
010-д	060-в	110-г	160-д
011-б	061-б	111-а	161-г
012-г	062-а	112-в	162-д
013-а	063-в	113-в	163-д
014-г	064-д	114-б	164-в
015-б	065-г	115-а	165-б
016-в	066-в	116-г	166-б
017-д	067-г	117-г	167-г
018-в	068-а	118-б	168-г
019-б	069-б	119-а	169-а
020-б	070-а	120-в	170-г
021-г	071-б	121-в	171-г
022-а	072-а	122-в	172-б
023-в	073-г	123-г	173-в
024-а	074-д	124-а	174-б
025-д	075-а	125-д	175-а
026-г	076-в	126-а	176-г
027-в	077-б	127-в	177-б
028-б	078-в	128-а	178-в
029-г	079-г	129-г	179-в
030-д	080-д	130-в	180-г
031-в	081-г	131-в	181-а
032-д	082-а	132-а	182-а
033-б	083-в	133-б	183-а
034-д	084-в	134-б	184-в
035-г	085-б	135-б	185-б
036-г	086-а	136-б	186-б
037-а	087-б	137-д	187-д
038-б	088-д	138-а	188-д
039-д	089-а	139-в	189-г
040-б	090-в	140-г	190-а
041-д	091-д	141-д	191-б
042-а	092-б	142-б	192-в
043-г	093-д	143-а	193-а
044-в	094-а	144-б	194-а
045-г	095-в	145-г	195-г
046-д	096-д	146-в	
047-д	097-б	147-в	
048-в	098-г	148-г	
049-в	099-а	149-г	
050-в	100-г	150-б	