


**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ДПО**

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой анестезиологии и
реаниматологии с курсом ДПО


_____/А.Н. Обедин/
« 21 » мая 2025 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование дисциплины	Оказание медицинской помощи в экстренной форме (симуляционный курс)
Специальность	31.08.09 Рентгенология
Форма обучения	Очная
Год начала подготовки	2025

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)

Коды и наименование компетенций	Наименование компетенций
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению
ОПК-7.	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

2. Виды оценочных материалов и соответствие с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	Виды оценочных материалов	Количество заданий
УК-3	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-7	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего		100 заданий

3. Банк заданий по оценки уровня формирования компетенций

№ п/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
1	УК -3	Прочитайте текст и установите соответствие																					
		1. Установите соответствие между видом дыхательного контура наркозного аппарата																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вид дыхательного контура</th> <th colspan="2">Характеристика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Открытый</td> <td>1</td> <td>Вдох осуществляется из дыхательно-наркозного аппарата, а выдох производит в атмосферу или в систему отвода дыхательных газов</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Закрытый</td> <td>2</td> <td>пациент выдыхает часть воздуха в атмосферу, а часть — в систему дыхательно-наркозного устройства</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Полуоткрытый</td> <td>3</td> <td>вдох осуществляется через маску, а выдох — в атмосферу.</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Полузакрытый</td> <td>4</td> <td>вдох и выдох пациент делает в систему дыхательно-наркозного аппарата.</td> </tr> </tbody> </table>	Вид дыхательного контура		Характеристика		А	Открытый	1	Вдох осуществляется из дыхательно-наркозного аппарата, а выдох производит в атмосферу или в систему отвода дыхательных газов	Б	Закрытый	2	пациент выдыхает часть воздуха в атмосферу, а часть — в систему дыхательно-наркозного устройства	В	Полуоткрытый	3	вдох осуществляется через маску, а выдох — в атмосферу.	Г	Полузакрытый	4	вдох и выдох пациент делает в систему дыхательно-наркозного аппарата.	А-3,Б-4,В-1, Г-2
		Вид дыхательного контура		Характеристика																			
		А	Открытый	1	Вдох осуществляется из дыхательно-наркозного аппарата, а выдох производит в атмосферу или в систему отвода дыхательных газов																		
		Б	Закрытый	2	пациент выдыхает часть воздуха в атмосферу, а часть — в систему дыхательно-наркозного устройства																		
В	Полуоткрытый	3	вдох осуществляется через маску, а выдох — в атмосферу.																				
Г	Полузакрытый	4	вдох и выдох пациент делает в систему дыхательно-наркозного аппарата.																				
2. Установите соответствие между типом боли и ее определением:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вид боли</th> <th colspan="2">Характеристика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Боль острая (ноцицептивная, физиологическая)</td> <td>1</td> <td>Боль недавно возникшая, обусловлена</td> </tr> </tbody> </table>	Вид боли		Характеристика		А	Боль острая (ноцицептивная, физиологическая)	1	Боль недавно возникшая, обусловлена	А- 1, Б -3, В -2														
Вид боли		Характеристика																					
А	Боль острая (ноцицептивная, физиологическая)	1	Боль недавно возникшая, обусловлена																				

)		активацией ноцицепторов повреждающими стимулами, является симптомом какого-то заболевания или повреждения тканей, исчезает при устранении повреждения, выздоровлении пациента	
		Б	Прорывная боль	2	Приобретает статус самостоятельного заболевания, существует длительное время (более 3 месяцев), зачастую на протяжении всей жизни пациента, в ряде случаев трудно установить ее этиологию	
		В	Боль хроническая (патологическая)	3	Временное резкое спонтанное или эпизодически возникающее усиление боли на фоне приема препаратов в пролонгированных формах. Этот вид боли обычно появляется внезапно, является очень интенсивным и коротким по времени	
3. Установите соответствие между формами обучения с их целями:						
		Форма обучения		Цель		
	А	Стажировка	1	Проверка уровня знаний		А -3, Б -1, В- 2, Г-4
	Б	Повышение квалификации	2	Приобретение практических навыков		
	В	Аттестация	3	Углубление профессиональных знаний		
	Г	Аккредитация	4	Проверка		

				профессиональных знаний и умений специалистов системы здравоохранения, для подтверждения соответствия их компетенций установленным нормам и требованиям.	
		4. Установите соответствие между сосудистым доступом и рекомендуемым сроком эксплуатации			А-2, Б-3, В-1
		Вид сосудистого доступа		Срок эксплуатации	
		А	Периферический венозный катетер из тефлона	1 от 9 до 14 дней	
		Б	Периферический венозный катетер из полиуретана	2 не более 3 суток	
		В	Краткосрочный не туннелируемый центральный венозный катетер	3 не более 6 суток	
		5. Установите соответствие между видом документации с их назначением			А -3, Б -2, В-1,Г- 4
		Вид документации		Его назначение	
		А	Журнал учёта болевых	1 Оформление временной нетрудоспособности	
		Б	Протокол консилиума	2 Документирование коллегиального решения	
		В	Листок нетрудоспособности	3 Регистрация пациентов	
		Г	История болезни	4 Ведение медицинской документации	
2	УК-3	Прочитайте текст и установите последовательность			
		1.Определите верную последовательность этапов при внедрении новой методики лечения в отделении			В→Б→А→Г→Д

		<p>анестезиологии и реанимации:</p> <p>А) Обучение персонала Б) Получение разрешений В) Разработка протокола лечения Г) Внедрение методики Д) Оценка эффективности</p>	
		<p>2. Установите правильную последовательность действий при возникновении внештатной ситуации в отделении анестезиологии и реанимации:</p> <p>А) Информирование руководства Б) Оценка ситуации В) Принятие экстренных мер Г) Координация действий персонала Д) Ликвидация последствий</p>	<p>Б→Г→В→А →Д</p>
		<p>3. Определите верную последовательность этапов при планировании работы отделения анестезиологии и реанимации:</p> <p>А) Анализ результатов работы Б) Постановка целей и задач В) Разработка плана мероприятий Г) Распределение ресурсов Д) Утверждение плана</p>	<p>Б→В→Г→Д →А</p>
		<p>4. Установите правильную последовательность действий при организации научной работы:</p> <p>А) Сбор и анализ данных Б) Выбор темы исследования В) Разработка методики исследования Г) Проведение исследования Д) Оформление результатов</p>	<p>Б→В→Г→А →Д</p>
		<p>5. Установите правильную последовательность действий при организации экстренной помощи:</p> <p>А) Оценка состояния пациента Б) Стабилизация состояния В) Оказание первой помощи Г) Документальное оформление</p>	<p>А→В→Б→Г</p>
3.	УК-3	<p>Прочитайте текст и продолжите предложение</p> <p>1. Распределение обязанностей между сотрудниками отделения анестезиологии и реанимации регламентируют _____</p> <p>2. Ключевым показателем при оценке эффективности работы отделения анестезиологии и реанимации является _____</p> <p>3. На материальное стимулирование персонала направлен _____ метод управления</p> <p>4. При выявлении нарушения в работе медицинского персонала оформляется _____</p> <p>5. Процесс обучения, направленный на совершенствование профессиональных знаний и навыков специалиста в рамках его основной или смежной специальности _____</p>	<p>Должностные инструкции</p> <p>Процент летальности</p> <p>Экономический</p> <p>Акт проверки</p> <p>Повышение квалификации</p>
4.	УК-3	<p>Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ</p>	

		<p>1. В отделении анестезиологии и реанимации планируется внедрение новой методики анестезиологического пособия при операциях на крупных суставах нижней конечности. Разработайте план организационных мероприятий</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование рабочей группы. 2. Обучение персонала новой методике 3. Проверка наличия необходимого оборудования. 4. Разработка протокола анестезиологического пособия. 5. Информирование смежных отделений
		<p>2. Между медсестрой отделения анестезиологии и реанимации и врачом-реаниматологом возник конфликт по поводу распределения обязанностей при работе с тяжелыми пациентами. Предложите алгоритм решения.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выяснение причин конфликта. 2. Проведение совместной встречи участников конфликта. 3. Разработка четкого регламента взаимодействия. 4. Утверждение новых должностных инструкций. 5. Контроль исполнения договоренностей
		<p>3. В отделении анестезиологии и реанимации возникла проблема с обеспечением расходными материалами для проведения нейроаксиальной анестезии. Предложите план решения.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ потребности в материалах. 2. Составление детальной заявки. 3. Поиск поставщиков.

			<p>4. Оптимизация использования имеющихся ресурсов.</p> <p>5. Внедрение системы учета материалов</p>
		<p>4. В отделении анестезиологии и реанимации планируется аттестация медицинского персонала. Составьте план проведения аттестации.</p>	<p>1. Определение сроков аттестации.</p> <p>2. Формирование аттестационной комиссии.</p> <p>3. Разработка критериев оценки.</p> <p>4. Подготовка методических материалов.</p> <p>5. Подведение итогов</p>
		<p>5. В отделении анестезиологии и реанимации возникла проблема с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Предложите меры по устранению.</p>	<p>1. Проведение внутреннего аудита.</p> <p>2. Выявление причин нарушений.</p> <p>3. Разработка корректирующих мероприятий.</p> <p>4. Дополнительное обучение персонала.</p> <p>5. Внедрение системы контроля</p>
5.	УК-3	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>1. Деонтология - наука о долге врача и среднего медицинского персонала, который состоит в том, чтобы</p> <p>А) Обеспечить наилучшее лечение</p> <p>Б) Создать благоприятную обстановку для выздоровления больного</p> <p>В) Установить доверительные отношения: больной - врач, врач - больной, врач - родственники больного,</p>	Г

	врачи между собой Г) Все перечисленное	
	2. Этические нормы врача определяются: А) Умениями и навыками Б) Законами и приказами В) Моральной ответственностью перед обществом Г) Этническими особенностями региона Д) Всем перечисленным	В
	3. Показания к госпитализации в отделение реанимации определяет А) Главный врач больницы Б) Зам. главного врача по лечебной части В) Профильный дежурный специалист приемного отделения Г) Зав. отделением реанимации, а в его отсутствие - дежурный врач Д) Зав. профильным отделением	Г
	4. При организации работы отделения анестезиологии и реанимации в первую очередь необходимо: А) Составить график дежурств Б) Определить структуру и штатное расписание В) Закупить оборудование Г) Разработать стандарты оказания помощи	Б
	5. В случае конфликта между врачами при распределении нагрузки руководитель должен: А) Принять сторону более опытного врача Б) Распределить нагрузку самостоятельно В) Организовать переговоры и поиск компромисса Г) Переложить решение на администрацию	В
	6. При планировании работы отделения анестезиологии и реанимации приоритет отдается: А) Желаниям пациентов Б) Наличию специалистов В) Сложности и срочности случаев Г) Плановым показателям	В
	7. При внедрении новых методов диагностики необходимо: А) Самостоятельное освоение персоналом Б) Обучение всего коллектива В) Приглашение специалистов для консультаций Г) Поэтапное внедрение с контролем	Г
	8. Распределение обязанностей между средним медперсоналом основывается на: А) Стаже работы	Б

	<p>Б) Квалификации и специализации В) Личном желании сотрудников Г) Графике отпусков</p>	
	<p>9. В случае ошибки младшего персонала руководитель должен:</p> <p>А) Сделать публичное замечание Б) Составить акт о нарушении В) Провести индивидуальную беседу Г) Немедленно отстранить от работы</p>	В
	<p>10. В случае нехватки специалистов руководитель должен:</p> <p>А) Отменить прием пациентов Б) Привлечь дополнительных сотрудников В) Перераспределить нагрузку Г) Отложить сложные случаи</p>	В
	<p>11. При организации обучения персонала приоритет отдается:</p> <p>А) Формальному прохождению программы Б) Практическим навыкам В) Теоретической подготовке Г) Самостоятельному обучению</p>	Б
	<p>12. В случае несогласия с решением руководства специалист должен:</p> <p>А) Игнорировать решение Б) Обсудить вопрос неформально В) Обратиться в вышестоящие инстанции Г) Представить аргументированные возражения</p>	Г
	<p>13. В случае нарушения трудовой дисциплины руководитель должен:</p> <p>А) Сделать устное замечание Б) Провести расследование и принять меры В) Сразу применить дисциплинарное взыскание Г) Игнорировать нарушение</p>	Б
	<p>14. При планировании закупки оборудования для отделения анестезиологии и реанимации в первую очередь учитывается:</p> <p>А) Стоимость оборудования Б) Потребности отделения и частота использования В) Рекомендации производителей Г) Наличие средств в бюджете</p>	Б
	<p>15. В случае массового поступления пациентов руководитель должен:</p> <p>А) Отказать в приеме лишних пациентов Б) Дождаться указаний руководства В) Отправить часть пациентов в другие отделения</p>	Г

	Г) Перераспределить персонал и привлечь дополнительных специалистов	
	16. В случае выявления нарушения санитарно-эпидемиологического режима руководитель должен: А) Сделать выговор персоналу Б) Составить акт и провести внеплановый инструктаж В) Закрыть отделение на дезинфекцию Г) Обратиться в надзорные органы	Б
	17. При организации обучения персонала по новым методикам диагностики необходимо: А) Организовать практические занятия с контролем усвоения Б) Провести только теоретическое обучение В) Отправить персонал на внешнее обучение Г) Доверить обучение старшим специалистам	А
	18. Распределение дежурств в отделении анестезиологии и реанимации основывается на: А) Желании сотрудников Б) Квалификации и опыте персонала В) Семейном положении врачей Г) Стаже работы	Б
	19. При возникновении конфликтной ситуации между отделениями руководитель должен: А) Принять сторону своего отделения Б) Обратиться к вышестоящему руководству В) Организовать переговоры и поиск компромисса Г) Игнорировать конфликт	В
	20. В случае нехватки расходных материалов руководитель должен: А) Приостановить работу отделения Б) Найти альтернативные источники и оптимизировать использование В) Переложить ответственность на бухгалтерию Г) Дождаться плановой закупки	Б
	21. В случае выявления профессионального выгорания сотрудников руководитель должен: А) Сделать выговор за снижение эффективности работы Б) Организовать меры по профилактике и поддержке персонала В) Заменить персонал на новый Г) Игнорировать проблему	Б
	22. При планировании научной работы отделения приоритет отдается: А) Желаниям отдельных сотрудников	Г

	<p>Б) Возможности публикации в журналах В) Наличию финансирования Г) Актуальным проблемам и потребностям практики</p>	
	<p>23. В случае возникновения аварийной ситуации руководитель должен:</p> <p>А) Эвакуировать пациентов и персонал Б) Оценить ситуацию и принять решение о дальнейших действиях В) Немедленно обратиться в аварийную службу Г) Доложить вышестоящему руководству</p>	Б
	<p>24. В случае выявления несоответствия квалификации персонала занимаемой должности руководитель должен:</p> <p>А) Уволить сотрудника Б) Организовать дополнительное обучение или переквалификацию В) Перевести на другую должность Г) Игнорировать несоответствие</p>	Б
	<p>25. В случае выявления нарушения трудовой дисциплины среди среднего медперсонала руководитель должен:</p> <p>А) Провести служебное расследование Б) Немедленно уволить нарушителя В) Сделать устное замечание Г) Сообщить главному врачу</p>	А
	<p>26. Установление должностей медицинского персонала в отделении реанимации сверх штатных нормативов</p> <p>А) Не допускается Б) Определяется руководителем лечебно-профилактического учреждения В) Допускается с разрешения вышестоящей организации Г) Разрешается индивидуально Д) Разрешается</p>	Б
	<p>27. В соответствии с основными задачами отделения анестезиологии и реанимации его персонал:</p> <p>А) Определяет наиболее оптимальные методы общей и местной анестезии Б) Осуществляет общую и специальную подготовку к наркозу В) Проводит обезболивание при акушерских операциях и родах Г) Проводит обезболивание при диагностических и лечебных процедурах Д) Все ответы правильны</p>	Д
	<p>28. Койки палат реанимации и интенсивной терапии считаются</p>	Г

		<p>А) Терапевтическими Б) Хирургическими В) Профиль определяется в зависимости от потребности Г) Не входят в число сметных Д) Гнойно-септическими</p>																					
		<p>29. Отделение анестезиологии-реаниматологии должно быть обеспечено медика-ментами, трансфузионными средствами в количествах из расчета</p> <p>А) На 3 суток работы Б) На количество анестезий и коек (среднегодовое) В) В количествах, необходимых для полноценного проведения анестезии, реанимации и интенсивной терапии Г) На 7 суток работы, кроме наркотиков и дорогостоящих Д) По предварительным заявкам</p>	В																				
		<p>30. Должности врачей анестезиологов-реаниматологов устанавливаются из расчета</p> <p>А) На количество операционных столов Б) На количество хирургических коек В) На оперативную активность Г) Исходя из потребности в анестезиологической помощи Д) По усмотрению администрации</p>	Б																				
6	ОПК-7	<p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>1. Установите соответствие между экстренным состоянием (заболеванием) и методом оказания помощи (лечением)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Экстренное состояние (заболевание)</th> <th colspan="2">Метод оказания помощи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Напряжённый пневмоторакс</td> <td>1</td> <td>Дефибриляция</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Апноэ</td> <td>2</td> <td>Непрямой массаж сердца</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Асистолия</td> <td>3</td> <td>Дренажирование плевральной полости</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Фибрилляция желудочков</td> <td>4</td> <td>Интубация трахеи, ИВЛ</td> </tr> </tbody> </table>	Экстренное состояние (заболевание)		Метод оказания помощи		А	Напряжённый пневмоторакс	1	Дефибриляция	Б	Апноэ	2	Непрямой массаж сердца	В	Асистолия	3	Дренажирование плевральной полости	Г	Фибрилляция желудочков	4	Интубация трахеи, ИВЛ	<p>А-3 Б-4 В-2 Г-1</p>
Экстренное состояние (заболевание)		Метод оказания помощи																					
А	Напряжённый пневмоторакс	1	Дефибриляция																				
Б	Апноэ	2	Непрямой массаж сердца																				
В	Асистолия	3	Дренажирование плевральной полости																				
Г	Фибрилляция желудочков	4	Интубация трахеи, ИВЛ																				
		<p>2. Укажите соответствие между экстренным состоянием (заболеванием) и препаратом, используемым в лечении данного заболевания</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Экстренное состояние (заболевание)</th> <th colspan="2">Препарат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Острый инфаркт миокарда</td> <td>1</td> <td>Глюкоза 40 %</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Анафилактический</td> <td>2</td> <td>Альтеплаза</td> </tr> </tbody> </table>	Экстренное состояние (заболевание)		Препарат		А	Острый инфаркт миокарда	1	Глюкоза 40 %	Б	Анафилактический	2	Альтеплаза	<p>А-3 Б-4 В-2 Г-1</p>								
Экстренное состояние (заболевание)		Препарат																					
А	Острый инфаркт миокарда	1	Глюкоза 40 %																				
Б	Анафилактический	2	Альтеплаза																				

	шок		(Актелизе)	
В	Тромбоэмболия легочной артерии	3	Морфина гидрохлорид	
Г	Гипогликемическая кома	4	Эпинефрин (Адреналин)	
3. Установите соответствие между дозировкой глюкокортикостероидов и стадией астматического статуса				А-2 Б-3 В-1
Стадия		Доза		
А	Стадия относительной компенсации	1	6 и более мг/кг м.т./сут.	
Б	Стадия «немного лёгкого»	2	1-2 мг/кг м.т./сут.	
В	Стадия гипоксической-гиперкапнической комы	3	3-5 мг/кг м.т./сут.	
4. Установите соответствие между антидотом и видами токсичных веществ:				А-2 Б-3 В-4 Г-1
Антидот		Вид токсических веществ		
А	Атропин 1 мг/мл	1	Изониазид, фтивазид, аминосалициловая кислота, алкоголь, грибы рода <i>Gyromitra</i> (строчки, содержащие гиromетрин), этиленгликоль	
Б	Аскорбиновая кислота 50 мг/мл	2	ФОС (карбофос, хлорофос и др.), пиретроиды, сердечные гликозиды, клонидин	
В	Ацетилцистеин 100 мг/мл	3	Продукты горения, калия перманганат, отравления соединениями железа в комплексе с дефероксамином, отравления алкоголем, сульфаниламидами, цианиды, метгемоглобинообразователи	

		Г	Пиридоксин 50 мг/мл	4	Парацетамол																	
		<p>5. Установите соответствие между методом экстракорпоральной гемокоррекции и удалением компонентов крови</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Ультрафильтрация</td> <td>1</td> <td>Эритроциты</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Эритроцитаферез</td> <td>2</td> <td>Вода</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Гемодиализ</td> <td>3</td> <td>Плазма крови</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Плазмаферез</td> <td>4</td> <td>Низкомолекулярные вещества</td> </tr> </table>				А	Ультрафильтрация	1	Эритроциты	Б	Эритроцитаферез	2	Вода	В	Гемодиализ	3	Плазма крови	Г	Плазмаферез	4	Низкомолекулярные вещества	<p>А-2 Б-1 В-4 Г-3</p>
А	Ультрафильтрация	1	Эритроциты																			
Б	Эритроцитаферез	2	Вода																			
В	Гемодиализ	3	Плазма крови																			
Г	Плазмаферез	4	Низкомолекулярные вещества																			
7	ОПК-7	Прочитайте текст и установите последовательность																				
		<p>1. В какой последовательности осуществляется СЛР у пациента, если во время операции и наркоза зарегистрирована остановка сердечной деятельности (асистолия)?</p> <p>А. Больного вентилировать со 100% подачей кислорода в режиме гипервентиляции. Б. Прекратить оперативное вмешательство. В. Прекратить введение анестетиков. Г. Начать проведение непрямого массажа сердца, Д. Проводить медикаментозное лечение данного вида остановки сердца</p>				<p>В, А, Б, Г, Д</p>																
		<p>2. Определите правильную последовательность действия при развитии анафилактического шока:</p> <p>А. Применение глюкокортикостероидов Б. Прекращение введения триггера В. Применение эпинефрина Г. Волевическая нагрузка кристаллоидами Д. Оценить состояния больного</p>				<p>Б, Д, В, Г, А</p>																
		<p>3. Установите последовательность действий при поступлении в отделение интенсивной терапии и реанимации больного с кровотечением из ЖКТ:</p> <p>А. Восполнение ОЦК (инфузия кристаллоидов) Б. Заместительная трансфузионная терапия В. Оценка состояния больного Г. Остановка кровотечения (эндоскопическим или хирургическим способом) Д. Обеспечение венозного доступа, забор анализов</p>				<p>В, Д, Г, А, Б</p>																
		<p>4. Установите последовательность действия при проведении дефибрилляции у пациента с фибрилляцией желудочков:</p> <p>А. Включить дефибриллятор, набрать необходимую энергию разряда Б. Подготовить грудную клетку В. Проверить безопасность и выполнить разряд Г. Нанести гель</p>				<p>Б, Г, А, В</p>																
		<p>5. Укажите последовательность действия при развитии злокачественной гипертермии при проведении ингаляционного наркоза:</p> <p>А. Перевести поддержание анестезии на безопасные</p>				<p>В, А, Г, Б, Д</p>																

		препараты. Б. Проводить коррекцию метаболического ацидоза и гиперкалиемии. В. Немедленно прекратить введение всех триггерных препаратов Г. Немедленно в/в ввести дантролен Д. Активно охлаждать пациента	
8	ОПК-7	<p>Прочитайте задачу и дайте развёрнутый ответ</p> <p>1. После спинальной анестезии лидокаином пациент жалуется на слабость и парестезию в нижних конечностях. С чем может быть связано данное состояние? План ваших действий</p> <p>2. Поступил больной тромбоэмболией в бассейне легочной артерии (ТЭЛА) с нестабильной гемодинамикой. Перечислите показания и противопоказания для применения тромболитических препаратов при ТЭЛА:</p>	<p>1. Вероятней всего имеет место локальное токсическое действие местного анестетика: транзиторный неврологический синдром, характерный для лидокаина. Данное осложнение проходит самостоятельно в течение нескольких дней.</p> <p>2. Для исключения гематомы, сдавливающей спинной мозг и элементы конского хвоста, показано выполнение КТ или МРТ.</p> <p>Показания: Развитие массивной ТЭЛА с явлениями артериальной гипотензии или шока (систолическое АД менее 90 мм рт. ст. или</p>

			<p>снижение АД на 40 мм рт. ст. более 15 минут, не вызванное аритмией, гиповолемией или сепсисом).</p> <p>2. У больных без признаков перегрузки правых отделов сердца тромболитическая терапия не показана.</p> <p>3. При шоке и гипотонии больным с ТЭЛА следует вводить тромболитические средства при отсутствии абсолютных противопоказаний к их применению.</p> <p>4. Абсолютными противопоказаниями для фибринолитической терапии являются: Активное продолжающееся внутреннее кровотечение и интракраниальное кровотечение.</p>
		<p>3. Назовите этапы назначения препаратов в соответствии с «лестницей обезболивания» ВОЗ:</p>	<p>1. Парацетамол/нестероидные противовоспалительные</p>

			препараты. 2. Слабые опиоиды. 3. Сильные опиоиды в малых дозах. 4. Сильные опиоиды в больших дозах
		4. Вам предстоит прогнозируемая трудная интубация. Какой миорелаксант в этой ситуации будет оптимальным и почему?	В этой ситуации оптимальным миорелаксантом будет рокуроний, при условии наличия специфического антидота – сугаммадекса. Если сугаммадекс Вам не доступен для применения, оптимальным миорелаксантом является короткодействующий деполяризующий миорелаксант - суксаметония хлорид или суксаметония иодид
		5. В приемное отделение стационара доставлен пациент с жалобами на недомогание, общую слабость, тошноту, рвоту, схваткообразные боли в эпигастрии, жидкий стул, сухость полости рта, нарушение зрения в виде ощущения пелены перед глазами, поперхивание при глотании, T-37,5°C. Данные жалобы возникли при употреблении в пищу вяленой рыбы. Осмотр подтвердил наличие нарушений глотания, диплопию. Ваш диагноз? Ваши действия?	Ботулизм; перевод в ОАРИТ, выполнение превентивной назотрахеальной интубации, промывание желудка, высокие очистительные клизмы; забор

			биоматериала на анализ; введение противоботулинической поливалентной сыворотки, либо комплекса моновалентных сывороток, дезинтоксикационная и антибактериальная терапия, кормление осуществлять через желудочный зонд.
9	ОПК-7	Продолжите предложение или вставьте пропущенные слова:	
		1. Наличие дренажей, центрального венозного катетера, эндотрахеальной трубки, трахеостомической канюли, мочевого катетера, цистостомы, гастростомы, электродов ЭКС, а также случаи выделения патогенных или условно патогенных микроорганизмов из выше указанных инвазивных устройств без клинических признаков инфекционного процесса _____ показанием для проведения антимикробной терапии	
		2. В экстренной хирургии начало медикаментозной тромбопрофилактики _____ низкомолекулярными гепаринами должно начаться не позже _____ ч после окончания хирургической операции, при отсутствии противопоказаний.	12
		3. После интубации необходимо выполнить аускультацию легких и оценить показатели _____	капнографии
		4. Решение о проведении манёвра открытия лёгких принимается врачом анестезиологом-реаниматологом и обязательно проводится в условиях тотальной _____.	миоплегии
		5. Гемодиализ показан при острой _____ недостаточности	почечной
10	ОПК-7	Прочитайте текст и выберите правильный ответ	
		1. Препаратом первого выбора при лечении анафилактического шока является: А. эпинефрин Б. норэпинефрин	А

	<p>В. дексаметазон Г. преднизолон</p>	
	<p>2. При непрямом массаже сердца для достижения оптимального эффекта производится А. 100 – 120 компрессий в минуту Б. 30 – 40 компрессий в минуту В. 120 – 160 компрессий в минуту Г. 60 - 80 компрессий в минуту</p>	А
	<p>3. На какую глубину необходимо производить вдавливание грудной клетки у взрослого пациента и подростка А. Не менее одной трети переднезаднего диаметра грудной клетки Б. Не менее 4 см В. Не более 5 см Г. Не менее 5 см и не более 6 см</p>	Г
	<p>4. При остановке сердца эпинефрин необходимо вводить взрослому в дозе А. 1 мг каждые 3-5 мин Б. 0,06 мг/кг каждые 3-5 мин В. 0,5 мг каждые 3-5 мин Г. 10 мг каждые 3-5 мин</p>	А
	<p>5. Начальная энергия разряда дефибрилляции при СЛР у взрослых (монофазный ток) А. 90 Дж Б. 270 Дж В. 360 Дж Г. 300 Дж</p>	В
	<p>6. Энергия разряда бифазного дефибриллятора при проведении СЛР у детей старше года составляет: А. 1 Дж/кг Б. 2 Дж/кг В. 3 Дж/кг Г. 4 Дж/кг Д. 5 Дж/кг</p>	Г
	<p>7. При острой массивной кровопотере рекомендуется начинать инфузионную терапию с: А. 5% раствора декстрозы Б. Раствора Рингера лактата В. Сбалансированных кристаллоидных растворов Г. Коллоидных растворов Д. Компонентов крови</p>	В
	<p>8. Проведение декураризации целесообразно при соблюдении следующих условий: А. При неполном восстановлении нервно-мышечной проводимости и появлении самостоятельного дыхания Б. При полной блокаде нервно-мышечной проводимости В. Через 20 минут при отсутствии спонтанной вентиляции Г. Сразу же по окончании наркоза независимо от</p>	А

	степени восстановления спонтанного дыхания	
	<p>9. Причиной угнетения дыхания при внутривенном введении барбитуратов является:</p> <p>А. Депрессия коры</p> <p>Б. Депрессия каротидного синуса</p> <p>В. Снижение чувствительности дыхательного центра к CO₂</p> <p>Г. Снижение чувствительности каротидных телец к CO₂</p> <p>Д. Снижение чувствительности дыхательных телец к O₂</p>	В
	<p>10. Протамина сульфат в дозе 1 мг нейтрализует:</p> <p>А. 2500 - 5000 ЕД гепарина</p> <p>Б. 1000 - 1500 ЕД гепарина</p> <p>В. 80 - 100 ЕД гепарина</p> <p>Г. 70 - 50 ЕД гепарина</p>	В
	<p>11. Лекарства, которые могут вызвать клинически важное выделение гистамина, включают</p> <p>А. Пропофол</p> <p>Б. Суксаметониум</p> <p>В. Панкурониум</p> <p>Г. Фентанил</p>	Б
	<p>12. Следующие вещества могут вызвать местный венозный тромбоз:</p> <p>А. Метогекситон</p> <p>Б. Панкурониум</p> <p>В. Этомидат</p> <p>Г. Диприван</p> <p>Д. Сукцинилхолин</p>	В
	<p>13. Доза кетамина для введения в наркоз у взрослого пациента равна:</p> <p>А. 5-7 мг/кг массы тела</p> <p>Б. 7-10 мг/кг</p> <p>В. 10-12 мг/кг</p> <p>Г. 3-5 мг/кг</p> <p>Д. 1-2 мг/кг</p>	Д
	<p>14. В лечении злокачественной гипертермии показаны мероприятия, за исключением:</p> <p>А. Физического охлаждения и нейровегетативной блокады</p> <p>Б. В/в введения дентролена, новокаинамида или никотинамида</p> <p>В. Применения бикарбоната, лазикса</p> <p>Г. Введения строфантина, хлористого Са</p> <p>Д. ИВЛ, оксигенотерапии, введения кортикостероидов</p>	Г
	<p>15. Прекураризация недеполяризующим миорелаксантом перед введением сукцинилхолина при вводимом наркозе производится с целью</p> <p>А. Предупреждения регургитации и послеоперационных мышечных болей</p> <p>Б. Предупреждения повышения внутриглазного</p>	Д

	<p>давления</p> <p>В. Предупреждения повышения уровня калия в плазме</p> <p>Г. Верно а) и б)</p> <p>Д. Верны все ответы</p>	
	<p>16. Использование закиси азота и ксенона противопоказано при:</p> <p>А. Травме головы</p> <p>Б. Перемежающейся порфирии</p> <p>В. Гигантской кисте легкого</p> <p>Г. Инфаркте миокарда</p> <p>Д. Множественной аллергии на внутривенные анестетики</p>	В
	<p>17. Системная токсичность местных анестетиков не увеличивается при</p> <p>А. Гипоксии</p> <p>Б. Добавлении вазоконстриктора</p> <p>В. Ацидозе</p> <p>Г. Гипопротеинемии</p> <p>Д. Печеночной недостаточности</p>	Б
	<p>18. Инфузионная терапия при остром перитоните во время предоперационной под-готовки преследует цель:</p> <p>А. Полную ликвидацию всех гидрогемодинамических и электролитных нарушений</p> <p>Б. Быструю коррекцию гиповолемии, стабилизацию гемодинамики и уменьшение дефицита внеклеточной жидкости</p> <p>В. Быструю коррекцию клеточного дефицита H₂O</p>	Б
	<p>19. В комплекс интенсивной терапии острого панкреатита входит</p> <p>А. Инфузионно-трансфузионная терапия</p> <p>Б.Применения методов экстракорпоральной детоксикации</p> <p>В. Обменное переливание крови</p> <p>Г. Все перечисленные методы</p> <p>Д. Верно только а) и б)</p>	Д
	<p>20. Целесообразно проводить предоперационную инфузионную подготовку у больных перитонитом в течение:</p> <p>А. Несколько минут</p> <p>Б. До устранения тяжелой гиповолемии, но не более 1 - 2 ч</p> <p>В. Не менее 3 - 5 ч</p> <p>Г. До полной коррекции электролитных нарушений</p> <p>Д. 10 - 12 ч</p>	Б
	<p>21. Больной поступил в операционную в состоянии шока с переломами обеих бедренных костей без повреждения магистральных сосудов. АД - 60/40 мм рт. ст. Число дыханий - 24-26 в минуту. Наиболее целесообразно в этой ситуации:</p> <p>А. Срочно начать инфузионную терапию с одновременным введением в наркоз</p>	Б

	<p>Б. Срочно начать инфузионную терапию, создать аналгезию, добиться стабилизации АД, затем начать проведение анестезии и операции</p> <p>В. Срочно интубировать больного и начать проведение инфузионной терапии</p>	
	<p>22. В терапии травматического шока первоначальные усилия направляются:</p> <p>А. На восстановление газообмена и ОЦК</p> <p>Б. На коррекцию КОС и ВЭБ</p> <p>В. На обезболивание</p> <p>Г. Все ответы правильны</p> <p>Д. Верно только а) и в)</p>	Д
	<p>23. При операциях на промежности, мочевом пузыре, предстательной железе, камнях нижней и средней трети мочеточников наиболее показаны:</p> <p>А. Эпидуральная и спинальная анестезия</p> <p>Б. Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием</p> <p>В. Местная анестезия</p>	А
	<p>24. Показанием к ИВЛ у больных с черепно-мозговой травмой служит все перечисленное, кроме</p> <p>А. Гиповентиляции</p> <p>Б. Коматозного состояния</p> <p>В. Отека мозга</p> <p>Г. Любых сомнений в адекватности спонтанного дыхания</p> <p>Д. $pO_2=80$ мм рт.ст., $pCO_2=36$ мм рт.ст.</p>	Д
	<p>25. При гипертермии центрального происхождения при черепно-мозговой травме наиболее эффективно:</p> <p>А. Антипиретики</p> <p>Б. Нейровегетативная блокада</p> <p>В. Физическое охлаждение</p> <p>Г. Верны все ответы</p> <p>Д. Верно б) и в)</p>	Д
	<p>26. Оптимальным вариантом анестезии при Кесаревом сечении у беременной, больной сахарным диабетом, является</p> <p>А. Эпидуральная анестезия</p> <p>Б. Эндотрахеальный наркоз</p> <p>В. Масочная анестезия</p> <p>Г. Сочетание эпидуральной анестезии и эндотрахеального наркоза</p>	А
	<p>27. При эмболии околоплодными водами необходимы</p> <p>А. Внутривенный наркоз, интубация, релаксация, ИВЛ, быстрое родоразрешение, антикоагулянтная терапия, ЭКГ-монитор</p> <p>Б. Искусственная гипотензия, оксигенотерапия в режиме ПДКВ через пары спирта, антикоагулянты, сердечные гликозиды при наличии отека легких</p> <p>В. Подавление фибринолиза, активная инфузионная терапия, фибриноген, оксигенотерапия, родоразрешение через естественные пути</p>	А
	<p>28. Комплекс интенсивной терапии и реанимации</p>	Б

	<p>новорожденного при тяжелой асфиксии и остановке кровообращения включает:</p> <p>А. Масочную вентиляцию легких с кислородом</p> <p>Б. Интубацию и ИВЛ, закрытый массаж сердца</p> <p>В. Медикаментозную стимуляцию дыхания</p> <p>Г. Внутрисердечное введение адреналина 0.1% раствора 0.1 - 0.2 мл через 5 - 6 мин после остановки сердца</p>	
	<p>29. При миастении противопоказан:</p> <p>А. Прозерин</p> <p>Б. Гексенал</p> <p>В. Атропин</p> <p>Г. Сукцинилхолин</p> <p>Д. Кетамин</p>	Г
	<p>30. Показанием к переводу больного на ИВЛ является</p> <p>А. Тахипноэ более 45 в минуту</p> <p>Б. Снижение РаО₂ менее 60 мм рт. ст.</p> <p>В. Уменьшение ДО на 50%, возрастание МОД на 160-180%</p> <p>Г. Верны все ответы</p> <p>Д. Верно только б) и в)</p>	Д