

Составить индивидуальный график вакцинации

Задача 1

На приеме ребенок 2,5 месяца. В анамнезе перинатальное поражение ЦНС, лечился в ОПН в течение 1 месяца. Сделаны V_{1,2} ВГ-В, V₁ БЦЖ-М по календарю. В возрасте 2 месяцев осмотрен неврологом. Диагноз: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, синдром двигательных нарушений, восстановительный период. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 2

Ребенок в возрасте 1 месяца. Родился от 3 беременности, перенес гемолитическую болезнь новорожденного, желтушную форму. Не привит. Состояние удовлетворительное. В 1 месяц консультирован неврологом: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, синдром ВЧГ стадия компенсации. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 3

На приеме ребенок 1 года 3 мес. С 6 мес. - пищевая аллергия с преимущественным преобладанием респираторного синдрома. На первом году закончены вакцинации БЦЖ-М, АКДС, против полиомиелита, ВГ-В, реакция Манту – сомнительная. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 4

Ребенок в возрасте 3 месяцев. С 2,5 месяца переведен на искусственное вскармливание, появилась сыпь. Установлен диагноз: атопический дерматит, младенческая форма, стадия обострения. V₁ БЦЖ-М и V₁ ВГ-В сделаны в роддоме, V₂ ВГ-В в 1 месяц. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 5

На приеме мальчик 12 мес. Вакцинальные комплексы БЦЖ-М, АКДС, вакцина против полиомиелита, ВГ-В закончены на первом году жизни. Консультирован неврологом в 11 месяцев, диагноз – гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, гипертензионно-гидроцефальный синдром стадия компенсации, поздний восстановительный период. На УЗИ головного мозга – множественные петрификаты, расширение боковых желудочков головного мозга. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 6

Мальчик 6 месяцев. В течение 1 месяца лечился в ОПН по поводу гнойно-воспалительного заболевания кожи (внутриутробное инфицирование). На момент осмотра – БЦЖ-М нет, V_{1,2} ВГ-В сделаны в возрасте 1 и 2 месяцев, V_{1,2} АКДС и ИПВ сделаны в срок. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 7

Мальчик 4 месяцев. На 1 месяце жизни лечился в ОПН, затем в течение 1 месяца - в неврологическом отделении с диагнозом: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, судорожный синдром, grand mal. Последний эпизод афебрильных судорог в 2 мес. Не привит. В настоящее время получает противосудорожные препараты. Невролог: противопоказаний к вакцинации нет. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 8

Ребенок в 6 месяцев перенес легкую форму кишечной инфекции невыясненной этиологии. До этого возраста сделаны V₁ БЦЖ-М, V_{1,2} АКДС, V_{1,2} ИПВ, V_{1,2} ВГ-В. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 9

Девочка двух лет. Относится к группе часто болеющих детей, основная причина – хронический аденоидит. До 1 года БЦЖ-М, АКДС, вакцина против полиомиелита, ВГ-В. Рубчика от БЦЖ-М нет. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 10

На приеме ребенок 12 месяцев, здоров. В роддоме сделана V₁ БЦЖ-М. Родители отказывались от проведения вакцинации до 12 мес. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 11

Ребенку 3 мес., находится в детском доме. В роддоме сделана V₁ БЦЖ-М, V₁ ВГ-В. В возрасте 1 мес. перенес пневмонию, фебрильные судороги, в 2 мес. – ОРВИ. Осмотрен неврологом: ПЭП, синдром внутричерепной гипертензии, ст. компенсации. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 12

На приеме ребенок 4 месяцев, здоров. Не привит в связи с отказом родителей. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 13

На приеме ребенок 4 месяцев. В 3,5 мес. - афебрильные судороги. Обследован у невролога, выставлен диагноз ПЭП: судорожный синдром. Получает противосудорожные препараты. Вакцинирован: V₁ БЦЖ-М, V_{1,2} ВГ-В, V₁ АКДС, V₁ ИПВ. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 14

На приеме ребенок 10 мес, здоров. В роддоме сделана V₁ БЦЖ-М. Далее не вакцинирован в связи с отказом родителей. В 6 мес перенес кишечную инфекцию, на введение амикацина - аллергическая сыпь. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 15

Ребенку 4 года, из семьи беженцев. Со слов матери, не вакцинирован. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 14 лет.

Задача 16

На приеме ребенок 12 мес. Страдает атопическим дерматитом. На момент осмотра единичные пятнисто-папулезные элементы сыпи на щеках. При попытке ввести в питание белок куриного яйца в 10 мес развился анафилактический шок. Вакцинирован по индивидуальному календарю: в роддоме -V₁ БЦЖ-М, V₁ ВГ-В, 4 мес - V₁ «Превенар», V₂ ВГ-В, в 6 мес. - V₁ «Пентаксим», V₂ «Превенар», Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 17

На приеме ребенок 1 года 6 мес. Вакцинирован: V₁ БЦЖ-М, V_{1,2} ВГ-В, V₁ АКДС, V₁ ИПВ. После 4 мес. родители отказались от вакцинации. С 11 мес. ежемесячно ОРВИ. Последний раз перенес ОРВИ легкой степени тяжести 2 недели назад. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 18

У ребенка в 8 мес. выявлена гипогаммаглобулинемия. Вакцинирован: в роддоме - V₁ БЦЖ-М, V₁ ВГ-В, 2 мес. - V₁ «Превенар», V₂ ВГ-В, 4 мес. - V₁ «Пентаксим», V₂ «Превенар». Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 19

Ребенку 2 мес. установлен диагноз: Перинатальная ВИЧ-инфекция. При иммунологическом обследовании отсутствует иммунодефицит, CD₄ больше 25%. Получает высокоактивную терапию (HAART). Не привит. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

Задача 20

Ребенку 3 лет установлен диагноз: бронхиальная астма, персистирующая, средней тяжести, контролируемая. Получает ингаляционные кортикостероиды в низких дозах в течении 3 мес. На первом году закончены вакцинации БЦЖ-М, АКДС, против полиомиелита, ВГ-В. Ревакцинация не была проведена в связи с частыми респираторными заболеваниями. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 21

Ребенок 12 мес. после ДТП получил переливание свежзамороженной плазмы. Ранее вакцинирован на календарю. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

Задача 22

Мальчик 6 лет, наблюдается по поводу гломерулонефрита с нефротическим синдромом, гормоночувствительный вариант с 5-летнего возраста, получал преднизолон, который отменен 6 месяцев назад. В настоящее время заболевание находится в стадии клинико-лабораторной ремиссии, без нарушения функции почек. До заболевания прививался по календарю, имеет законченные вакцинальные комплексы БЦЖ-М, АКДС, против полиомиелита, ВГ-В, RV₁ - АКДС, RV_{1,2} ОПВ. Составьте план профилактических прививок до 18 лет.

Задача 23

На приеме ребенок 4 лет. Наблюдается с рождения кардиологом с диагнозом ВПС: ДМПП, НК 2Аст. В 1 год было проведено оперативное лечение ВПС. Вакцинирован до 2 лет: БЦЖ-М, V_{1,2} ВГ-В, V_{1,2} АКДС и V_{1,2} ИПВ. Относится к группе часто болеющих детей. В 4 года консультирован кардиологом – ВПС: состояние после оперативного вмешательства ДМПП, НК 0. Составьте план вакцинации этому ребенку до 7 лет.

Задача 24

На приеме ребенок 2 месяцев. Родился на сроке 32 нед с массой 1900. ОПА 7-8. У матери во время беременности впервые выявлен HBsAg. Находился в отделении патологии новорожденных с диагнозом «Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС», выписан на 14 сутки. Вакцинирован: V_{1,2} ВГ-В. Наблюдается с диагнозом «Группа риска по HBV-инфекции», HBsAg отриц. Невролог «ПЭП, с. двигательных нарушений,

восстановительный период». Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.